

Total protein FS* (Proteína total FS*)

Información de Pedido

Nº de pedido

1 2311 99 10 920

Tamaño del envase



800 (4 x 200)

Uso Previsto

Reactivo de diagnóstico para la determinación cuantitativa in vitro de la proteína total en suero humano o plasma heparinizado en respons[®]940 automatizado.

Resumen

La medición de los niveles de proteínas totales en suero o plasma humano es esencial para el diagnóstico y seguimiento de diversas enfermedades, incluidas las que afectan al hígado, los riñones y la médula ósea, así como otros trastornos metabólicos y nutricionales [1]. Las proteínas plasmáticas se sintetizan principalmente en el hígado, las células plasmáticas, los ganglios linfáticos, el bazo y la médula ósea. Los estados de enfermedad pueden dar lugar a desviaciones de la concentración total de proteínas y de la distribución de las fracciones individuales de proteínas con respecto a los valores normales [1-3]. La hipoproteïnemia, o niveles bajos de proteínas, puede ser consecuencia de afecciones como la pérdida de sangre, la malabsorción intestinal (esprúe), el síndrome nefrótico, las quemaduras graves, el síndrome de retención de sal y el kwashiorkor (deficiencia aguda de proteínas) [4]. La hiperproteïnemia, es decir, un alto contenido en proteínas puede observarse en la deshidratación grave y en enfermedades como el mieloma múltiple. Pueden aparecer cambios en el porcentaje de proteínas plasmáticas debido a desplazamientos en una fracción proteica, a menudo sin alterar la cantidad de proteínas. La relación albúmina/globulina (A/G) sirve como índice común para evaluar la distribución de estas fracciones proteicas. Los cambios notables en esta proporción pueden indicar cirrosis hepática, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, hepatitis aguda, lupus eritematoso sistémico y diversas inflamaciones agudas y crónicas [4,5].

Método

Test fotométrico según el método de biuret

Las proteínas, juntas con los iones de cobre forman un complejo de color azul violeta en una solución alcalina. La absorbancia del color es directamente proporcional a la concentración.

Reactivos

Componentes y Concentraciones

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| R1: | Hidróxido de sodio | 100 mmol/L |
| | Tartrato de potasio sódico | 17 mmol/L |
| R2: | Hidróxido de sodio | 500 mmol/L |
| | Tartrato de potasio sódico | 80 mmol/L |
| | Ioduro de potasio | 75 mmol/L |
| | Sulfato de cobre | 30 mmol/L |

Almacenamiento y Estabilidad

Los reactivos son estables hasta la fecha de expiración indicada en el kit, si son almacenados entre 2 y 25 °C, y si se evita la contaminación. No congelar y proteger de la luz.

La estabilidad del reactivo tras la apertura es de 18 meses hasta la fecha de caducidad.

Advertencias y Precauciones

- Los componentes contenidos en Proteína total FS están clasificados de acuerdo con el reglamento CE 1272/2008 (CLP) como sigue:



⚠ Reactivo 1: Atención. H290 Puede ser corrosivo para los metales. P234 Conservar únicamente en el embalaje original. P390 Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.



⚠ Reactivo 2: Atención. Contiene ioduro de potasio. H290 Puede ser corrosivo para los metales. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H373 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P234 Conservar únicamente en el embalaje original. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

- En el suero o plasma de pacientes quienes han recibido intravenosamente grandes cantidades de povidonas, se pueden medir altos valores de proteína total con el método de biuret. En tales casos se ha de usar un método alternativo (p.ej. Kjeldahl).
- En casos muy raros, especímenes de pacientes sufriendo de gammopatías podrían acabar en valores falsificados [6].
- En caso de mal funcionamiento del producto o de alteración de su aspecto que pudiera afectar al desempeño, contactar al fabricante.
- Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde se encuentre el usuario y/o el paciente.
- Consultar las fichas de seguridad (FDS) de los reactivos y observar todas las medidas de precaución necesarias para la manipulación de reactivos de laboratorio. Para el diagnóstico, se recomienda evaluar los resultados según la historia médica del paciente, los exámenes clínicos, así como los resultados obtenidos con otros parámetros.
- Únicamente para el empleo profesional.

Manipulación de Desechos

Consultar los requisitos legales locales para las regulaciones de eliminación de productos químicos como se señala en la FDS correspondiente para determinar la eliminación segura.

Advertencia: Manipular los residuos como material potencialmente biopeligroso. Eliminar los residuos de acuerdo con las instrucciones y procedimientos de laboratorio aceptados.

Preparación del Reactivo

Los reactivos son listos para usar. Los frascos se colocan directamente en el rotor de reactivos.

Materiales Requeridos

Equipo general de laboratorio

Espécimen

Suero humano o plasma heparinizado

Utilice únicamente tubos o recipientes de toma de muestras adecuados para la recogida y preparación de las mismas.

Cuando utilice tubos primarios, siga las instrucciones del fabricante.

Estabilidad [7]:

6 días de 20 a 25 °C

4 semanas de 4 a 8 °C

1 año a -20 °C

Congelar sólo una vez. Desechar las muestras contaminadas.

Calibradores y Controles

Se recomienda TruCal U de DiaSys para la calibración. Los valores del calibrador son trazables al método de biuret. Utilizar TruLab N y P de DiaSys para el control de calidad interno. Todos los valores del ensayo de los controles son trazables al sistema reactivo/calibrador de DiaSys. El control de calidad debe realizarse después de la calibración. Los intervalos y límites de control deben adaptarse a los requisitos individuales de cada laboratorio. Los resultados deben estar dentro de los rangos definidos. Siga los requisitos y directrices legales pertinentes. Cada laboratorio debería establecer medidas correctoras en caso de obtener valores fuera del intervalo preestablecido.

| | Nº de pedido | Presentación |
|----------|------------------|--------------|
| TruCal U | 5 9100 99 10 063 | 20 x 3 mL |
| | 5 9100 99 10 064 | 6 x 3 mL |
| TruLab N | 5 9000 99 10 062 | 20 x 5 mL |
| | 5 9000 99 10 061 | 6 x 5 mL |
| TruLab P | 5 9050 99 10 062 | 20 x 5 mL |
| | 5 9050 99 10 061 | 6 x 5 mL |

Características

Rango de medición de 0,3 g/dL a 14 g/dL. La linealidad < 0,36 g/dL se da a $\pm 0,036$ g/dL, entre 0,36 g/dL a 0,6 g/dL dentro de ± 10 %, a > 0,6g/dL dentro de ± 5 %.

En caso de concentraciones más elevadas, medir los especímenes otra vez después de una dilución manual con solución NaCl (9 g/L) o por la función de repetición del ciclo.

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Límite de prueba** | 0,3 g/dL |
| Límite de cuantificación** | 0,3 g/dL |
| Estabilidad en el analizador | 6 semanas |
| Estabilidad de la calibración | 1 semana |

| Interferencia por | Interferencias ≤ 10 % hasta | Concentración del analito [g/dL] |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ácido ascórbico | 30 mg/dL | 7,00 |
| | 30 mg/dL | 7,82 |
| Bilirrubina (conjugada) | 73 mg/dL | 7,22 |
| | 73 mg/dL | 9,10 |
| Bilirrubina (no conjugada) | 72 mg/dL | 6,82 |
| | 72 mg/dL | 8,66 |
| Dextrano | 36 mg/dL | 6,84 |
| | 36 mg/dL | 8,69 |
| Hemólisis | 660 mg/dL | 7,41 |
| | 600 mg/dL | 9,14 |
| Lipemia (triglicéridos) | 1500 mg/dL | 6,62 |
| | 2000 mg/dL | 8,78 |

Para más información sobre las sustancias interferentes, consultar la bibliografía [8-10].

| Precisión | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Repetibilidad (n=20) | Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3 |
| Valor medio [g/dL] | 4,71 | 6,89 | 14,0 |
| CV [%] | 0,719 | 0,760 | 0,563 |
| En el laboratorio (n=80) | Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3 |
| Valor medio [g/dL] | 4,62 | 6,34 | 11,5 |
| CV [%] | 2,69 | 1,97 | 1,24 |

| Comparación de métodos (n=154) | |
|--------------------------------|--|
| Test x | Proteína total competidora (cobas c 501) |
| Test y | Proteína total FS de DiaSys (respons [®] 940) |
| Pendiente | 0,967 |
| Intersección | 0,108 g/dL |
| Coeficiente de correlación | 0,999 |

** según CLSI documento EP17-A2, Vol. 32, No. 8

Valores de Referencia [3]

| | [g/dL] |
|----------------|---|
| Adultos | 6,6 – 8,3 |
| Niños | |
| 1 – 30 día(s) | Femenino 4,2 – 6,2 Masculino 4,1 – 6,3 |
| 31 – 182 días | Femenino 4,4 – 6,6 Masculino 4,7 – 6,7 |
| 183 – 365 días | Femenino 5,6 – 7,9 Masculino 5,5 – 7,0 |
| 1 – 18 año(s) | Femenino 5,7 – 8,0 Masculino 5,7 – 8,0 |

Cada laboratorio debe comprobar si los valores de referencia indicados son adecuados para sus pacientes y si es necesario, determinar sus propios valores de referencia.

Bibliografía

- Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 644-7.
- Johnson Am, Rohlfis EM, Silverman LM. Proteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 4th ed. St. Louis, MO: Elsevier Saunders Company; 2006. p. 533-595.
- Plasma protein diagnostics. In: Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics [Internet]. Prof. Lothar Thomas; 2023 [cited 2024 06 03]. Available from: <https://www.clinical-laboratory-diagnostics.com>.
- Wang A, Zhang Y, Xia G, et al. Association of serum albumin to globulin ratio with outcomes in acute ischemic stroke. CNS Neurosci Ther. 2023; 29: 1357-1367.
- Li J, Li Z, Hao S, Wang J, et al. Inversed albumin-to-globulin ratio and underlying liver disease severity as a prognostic factor for survival in hepatocellular carcinoma patients undergoing transarterial chemoembolization. Diagn Interv Radiol. 2023 May 31;29(3):520-528.
- Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: mechanisms, detection and prevention. ClinChemLabMed 2007;45(9):1240-1243.
- Guder WG, da Fonseca-Wollheim F, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B. Quality of Diagnostic Samples. 3rd edition; 2010. p. 58-9.
- Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th ed. Volume 1 and 2. Washington, DC: The American Association for Clinical Chemistry Press 2000.
- Young DS. Effects on Clinical Laboratory Tests - Drugs Disease, Herbs & Natural Products, <https://clinfx.wiley.com/aaccweb/aacc/>, accessed in April 2021. Published by AACC Press and John Wiley and Sons, Inc.
- Sonntag O, Scholer A. Drug interference in clinical chemistry: recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug interference studies. Ann Clin Biochem. 2001 Jul;38:376-85.

Las adiciones y/o modificaciones al documento se resaltan en gris. Las supresiones se comunican a través de información al cliente indicando el no de la edición de la técnica/de la instrucción de uso.



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Alemania
www.diasys-diagnostics.com

* Fluid Stable = Líquido Estable

Total protein FS

Application for serum and plasma

| Test Details | | Test Volumes | | Reference Ranges | |
|--------------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------|
| Test | : TP | | | Auto Rerun | <input type="checkbox"/> |
| Report Name | : Total protein | | | Online Calibration | <input type="checkbox"/> |
| Unit | : g/dL | Decimal Places | : 2 | Cuvette Wash | <input type="checkbox"/> |
| Wavelength-Primary | : 546 | Secondary | : 0 | Special Diluent | <input type="checkbox"/> |
| Assay Type | : 2-Point | Curve Type | : Linear | Warn after | : 20 |
| M1 Start | : 24 | M1 End | : 24 | Reagents Used | : 2 |
| M2 Start | : 57 | M2 End | : 57 | Reagent R1 | TP R1 |
| Sample Replicates | : 1 | Standard Replicates | : 2 | Reagent R2 | TP R2 |
| Control Replicates | : 1 | Control Interval | : 0 | Consumables/Calibrators: | |
| Reaction Direction | : Increasing | React. Abs. Limit | : 0.0000 | Blank /Level 0 | 0 |
| Prozone Limit % | : 0 | Prozone Check | : Lower | Calibrator 1 | * |
| Linearity Limit % | : 0 | Delta Abs./Min. | : 0.0000 | Calibrator 2 | |
| Technical Minimum | : 0.3000 | Technical Maximum | : 14.0000 | Calibrator 3 | |
| Y = aX + b a= | : 1.0000 | b= | : 0.0000 | Calibrator 4 | |
| Reagent Abs Min | : 0.0000 | Reagent Abs Max | : 0.0000 | Calibrator 5 | |

| Test Details | | Test Volumes | | Reference Ranges | |
|--|------------------|------------------|----------|---|--|
| Test | : TP | | | | |
| Sample Type | : Serum | | | | |
| Sample Volumes | | | | Sample Types | |
| Normal | : 5.00 μ L | Dilution Ratio | : 1 X | <input checked="" type="checkbox"/> Serum <input type="checkbox"/> Urine <input type="checkbox"/> CSF <input checked="" type="checkbox"/> Plasma <input type="checkbox"/> Whole Blood <input type="checkbox"/> Other | |
| Increase | : 9.00 μ L | Dilution Ratio | : 1 X | | |
| Decrease | : 2.00 μ L | Dilution Ratio | : 1 X | | |
| Standard Volume | : 5.00 μ L | | | | |
| | | | | | |
| Reagent Volumes and Stirrer Speed | | | | | |
| RGT-1 Volume | : 180.00 μ L | R1 Stirrer Speed | : Medium | | |
| RGT-2 Volume | : 45.00 μ L | R2 Stirrer Speed | : High | | |

| Test Details | | Test Volumes | | Reference Ranges | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|--|
| Test | : TP | | | | |
| Sample Type | : Serum | | | | |
| Reference Range | : DEFAULT | | | | |
| Category | : Male | | | | |
| Reference Range | | | | Sample Types | |
| | Lower Limit (g/dL) | Upper Limit (g/dL) | | | |
| Normal | : # | : # | <input checked="" type="checkbox"/> Serum <input type="checkbox"/> Urine <input type="checkbox"/> CSF <input checked="" type="checkbox"/> Plasma <input type="checkbox"/> Whole Blood <input type="checkbox"/> Other | | |
| Panic | : # | : # | | | |

* Enter calibrator value
Editable by user